

Empfehlung: FÖKO-Mischung für die Einsatz in der Fahrgassenmitte

Kräuter:	Deutscher Name	Anteil Gew.proz.
<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe	1.5%
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	0.5%
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	2.5%
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte	2.0%
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	4.0%
<i>Crepis capillaris</i>	kleinköpfiger Pippau	2.0%
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	5.0%
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	3.0%
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	5.0%
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	1.0%
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	6.0%
<i>Hypochoeris radicata</i>	Ferkelkraut	5.0%
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	5.0%
<i>Leontodon hispidus</i>	Rauer Löwenzahn	2.5%
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite	4.0%
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornschotenklee	7.0%
<i>Malva alcea</i>	Spitzblatt-Malve	3.0%
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	3.0%
<i>Medicago lupulina</i>	Gelbklee	6.0%
<i>Medicago sativa</i>	Saat-Luzerne	10.0%
<i>Picris hieracioides</i>	Gemeines Bitterkraut	4.0%
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	4.0%
<i>Silene vulgaris</i>	Taubenkropf-Leimkraut	8.0%
<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee (Wildform)	2.0%
<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee	4.0%

Schnellbegrüner/Erstbegrüner		Anteil Gew.proz.
<i>Centaurea cyanus</i>	Konrblume	20.00 %
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Buchweizen	35.00 %
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	10.00 %
<i>Sinapis arvensis</i>	Ackersenf	20.00 %
<i>Lepidium sativum</i>	Garten-Kresse	1.00 %
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriander	13.80 %
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille	0.20 %

Im Projekt validierte Mischung:
 25 autochthone Wildkräuterarten
 sowie 7 Arten im Schnellbegrüner.

50 cm Einsatzbreite,
 4,5 g/qm Saatgutdichte
 2,5 g/qm Kräutermischung
 + 2 g/qm Schnellbegrüner)



Mai



Juni



Juli



August

Blühaspekte